



# Echelles d'évaluation du syndrome de sevrage



## AWS (Alcohol withdrawal scale de Haertzen)

- 60 items , Vrai/Faux, patients

Haertzen C, Hill H, Belleville R. Development of the addiction research center inventor (ARCI) : Selection on items that are sensitive to the effects of various drugs. *Psychopharmacologia* 1963;19:155-66.

## CIWA (Clinical institute withdrawal assessment)

- Instruments de référence dans les études
- 10 rubriques, total maximum 67

Sullivan JT, Sykora K, Schneiderman J, Naranjo CA. Assessment of alcohol withdrawal: the revised clinical institute withdrawal assessment for alcohol scale (CIWA-Ar). *Br J Addict* 1989; 84:1353-7.

## Indice de Cushman

- Constantes cliniques - IDE
- Le plus pratique

Cusman P Jr, Forbes R, Lerner W, Stewart M. Alcohol withdrawal syndromes : clinical management with lofexidine. *Alcoholism Clin Exp Res* 1985 ; 9 : 103-8.



## Score clinique de surveillance de sevrage de Cushman

	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Pouls (battements/min)</b>	< 80	81-100	101-120	> 120
<b>PA systoliques (mmHg)</b>				
<b>18-30 ans</b>	< 125	126-135	136--145	> 145
<b>31-50 ans</b>	< 135	136-145	146--155	> 155
<b>&gt;50 ans</b>	< 145	146-155	156--165	> 165
<b>Fréquence respiratoire</b>	< 16	16-25	26-35	> 35
<b>Tremblements</b>	0	main en extension	membre sup	généralisés
<b>Sueurs</b>	0	Paumes	Paumes et front	généralisés
<b>Agitation</b>	0	Discrète	généralisée controlable	généralisée incontrolable
<b>Troubles sensoriels</b>	0	gêne par le bruit ou lumière, prurit	Hallucinations critiquées	Hallucinations non critiquées

Cusman P Jr, Forbes R, Lerner W, Stewart M. Alcohol withdrawal syndromes : clinical management with lofexidine. *Alcoholism Clin Exp Res* 1985 ; 9 : 103-8.