



16 Mars 2009

THE SOONER, THE BETTER

Cher Docteur,

Différents travaux ont montré que la dialyse hépatique **MARS** améliorait les paramètres hémodynamiques par une augmentation de la pression artérielle et des index de résistance vasculaire chez les patients cirrhotiques en phase de décompensation, dans les hépatites alcooliques avec une sévère défaillance hépatique ainsi que dans les hépatites fulminantes.

F. Pugliese et al.a publié un travail comprenant **2027 traitements MARS** sur **191 patients** soit en décompensation aigue, fulminant, soit sur chronique de différentes étiologies. Chez ces deux catégories de patients on observe une amélioration de la valeur moyenne de pulsation cardiaque (HR), de la pression artérielle moyenne (MAP), de l'index cardiaque (CI), de index de résistance vasculaire systémique (SVRI), index de résistance pulmonaire (PVRI) et des besoins en drogues vasoactives (dobutamine et noréphinéphrine), ce après une seule procédure **MARS**.

Je vous propose la lecture de cette publication par le lien suivant :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18675091?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

Toute l'équipe Hosal Gambro a pour objectif de vous apporter tout le support, qu'il soit logistique ou médical donc n'hésitez pas à nous contacter.

Cordialement,

L'équipe **MARS**